

# TRATAMENTO DE LESÃO CUTÂNEA MALIGNA NA ATENÇÃO DOMICILIAR: IMPORTÂNCIA CLÍNICA E FINANCEIRA DA ESCOLHA CORRETA DOS MATERIAIS

**Autores:** Maria KMA, Menezes CB, Gaspar HA, Oliveira CF  
**Instituição:** Home Doctor - Empresa de Atenção Domiciliar – São Paulo/SP  
**Email:** iep@homedoctor.com.br

**INTRODUÇÃO:** Lesões vegetantes malignas resultam da proliferação neoplásica com infiltração cutânea e usualmente se apresentam com aspecto de lesão vegetante, com odor fétido, grande quantidade de secreção e dor.

**OBJETIVO:** O objetivo foi evidenciar a importância clínica e financeira da escolha adequada das coberturas para tratamento de feridas em pacientes oncológicos.

**MÉTODO:** Avaliado paciente com história pregressa de tumor de cólon, apresentando lesão vegetante neoplásica em rebordo costal, sendo analisado a aplicação da tecnologia de cobertura em âmbito hospitalar e na Atenção Domiciliar.

## RESULTADO E DISCUSSÃO:


Ferida inicial em 31/05/18 com presença de tumefação em região costal direita, com 10 x 8,5 cm de diâmetro e 5 cm de altura, exsudato serohemático intenso e odor fétido, após 47 dias de tratamento apresentou diminuição da extensão da ferida para cerca de 3 cm de diâmetro, com involução do tumor, exsudato hemático em pouca quantidade e controle do odor.

**Figura: A esquerda lesão em início de tratamento e a direita após 47 dias**




**31/05/18:** Ferida extensa com saída de grande quantidade de exsudato e odor fétido.

**17/07/18:** Ferida com diminuição importante do diâmetro, exsudato e odor.



**Gráfico 1 - Utilização de insumos hospitalares comparado ao utilizado pela Home Doctor**



**Gráfico 2 - Comparação do custo hospitalar com o custo da Home Doctor**

**CONCLUSÃO:** O tratamento de feridas neoplásicas é um pilar fundamental dentro da abordagem do paciente oncológico, seja na fase de tratamento curativo da doença ou em fase de palição, pois é capaz de melhorar a qualidade de vida. A escolha correta do material de cobertura de feridas utilizado para o tratamento é importante e capaz de acelerar a resolução do quadro de forma custo-efetiva.

## Referências bibliográficas

- Silva S.P. O desafio do enfermeiro no controle do odor das feridas tumorais em pacientes sob internação domiciliar. *Rio de Janeiro*; s.n.; 2004. 31 p. tab.
- Haisfield-Wolfe ME, Rund C. Malignant cutaneous wounds: a management protocol. *Ostomy Wound Manage*. 1997;43(1):56-60.
- Santos, Cristina Mamédio da Costa; Pimenta, Cibele Andruccioli de Mattos. Lesões vegetantes malignas: diretrizes para o cuidado / Malignant Vegetative Lesion - Guidelines for Palliative Care. *Mundo saúde*;27(1):124-132, jan.-mar.2003